

Cerpofor Alparex

Brugervejledning

DK

Effektiv mod usynlige parasitter, svamp og hvidpletsyge.

Beregning af akvariets volumen

Beregn akvariets volumen så nøjagtigt som muligt: længde x bredde x højde, målt i decimeter, giver tankens volumen i liter. Derefter skal volumen af eventuelt bundlag, planter, sten, forstenet træ, dekorationer osv. trækkes fra. Disse udgør normalt omkring 10 %, men kan udgøre op til 30 % i tæt indrettede akvarier.

Cerpofor Alparex fås i følgende størrelser: 100 ml til 500 l akvarievand og 1.000 ml til 5.000 l.

Vandkvalitet

God vandkvalitet er afgørende for en effektiv behandling og for, at de syge fisk hurtigt kommer sig. Test derfor altid vandkvaliteten før og efter behandlingen, og korriger den om nødvendigt.

Dosering

1 ml pr. 5 liter akvarievand. Mål den nødvendige mængde af med det medfølgende målebæger, opløs den i 1 liter akvarievand, og fordel blandingen over vandoverfladen. Tænd en luftpumpe. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at gentage behandlingen. Om nødvendigt kan dette gøres med en halv dosis på 3. og 5. dag.

Fjern aktivt kul og zeolit under behandlingen; UV-lamper og ozon skal være slukket indtil en uge efter den sidste dosering. Der bør ikke foretages vandskift under behandlingen, medmindre dårlig vandkvalitet gør det nødvendigt. I så fald skal der doseres igen med 1 ml pr. 5 l tilsat postevand.

Akvariefilteret kan være tændt under behandlingen. Behandling med Cerpofor Alparex misfarver vandet. Farven kan fjernes ved at genoptage de ugentlige vandskift (vi anbefaler 10-20 %) en uge efter den sidste tilsætning af Alparex, og ved at filtrere over aktivt kul.

Advarsel

Så vidt vides er dette produkt uskadeligt for hvirvelløse dyr som frøer, rejer, ferskvandskrebs og snegle. Det kan vi desværre ikke garantere, så brug af Cerpofor Alparex, når sådanne dyr er til stede, sker på eget ansvar. Hvis du har positive eller negative erfaringer, bedes du give os besked via www.colombo.nl eller e-mail: info@colombo.nl

Cerpofor Alparex er udviklet til brug i almindelige selskabsakvarier med en pH-værdi mellem 7 og 8,5 og en KH-værdi på 4-8°DH. Specialakvarier har ofte unormale vandværdier, hvilket kan medføre en unormal, ofte negativ reaktion på Alparex. Det gælder især akvarier med lav pH-værdi og/eller KH-værdi samt akvarier, hvor der bruges omvendt osmosevand med meget lav ledningsevne. Vildtfangede fisk kan være meget følsomme over for medicin og reagerer ofte dårligere på medicin end opdrættede fisk. Brug af Alparex i disse situationer sker udelukkende på eget ansvar!

Må kun anvendes til prydfisk i ferskvandsakvarier. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares i æsken ved en temperatur på 4 til 32 °C. Må ikke indåndes. Undgå kontakt med hud og øjne. Søg straks læge ved indtagelse, og vis emballagen eller etiketten. Dette produkt giver permanente pletter på tøj, belægningsmaterialer osv.

Kombinationer

Anvendelse af mere end 2 produkter og/eller lægemidler i kombination sker på eget ansvar. Må ikke anvendes samtidig med produkter af anden oprindelse!

Information

Hvidpletsyge skyldes Ichthyophthirius multifiliis. Sygdommen opstår som regel, når fiskens naturlige modstandskraft er nedsat eller svækket. Det kan for eksempel ske i forbindelse med transport, overbefolkning eller introduktion af nye fisk. Angrebne fisk får hvide pletter på huden, som er 0,1 til 1 mm store. Pletterne kan være enkeltstående eller sidde i klynger. Fiskene gnider huden mod planter eller sten og kan undertiden gynge frem og tilbage i vandet. Hvis en stor del af huden (som bruges til åndedræt) går tabt, eller gællerne angribes, opstår der åndenød, og fiskene vil til sidst dø.

Svampeinfektioner (som oftest forårsaget af Saprolegnia) viser sig som gråhvide, vatlignende belægninger på huden og/eller gællerne. Svampen vokser på hudens overflade, men kan også trænge ind og angribe muskler og indre organer. Sådanne tilfælde ender ofte med døden.

Kløe kan skyldes flere forskellige parasitter. Det gælder for eksempel Trichodina, Ichthyobodo og Chilodonella samt Gyrodactylus (hudikter) og Dactylogyrus (gælleikter). Det er flade sugeorme, som er ca. 0,3-0,5 mm store. Fiskens hud fungerer som den vigtigste barriere mod sygdomsfremkaldende organismer, og infektion med én parasit kan bane vejen for andre.

Der findes ofte flere slags parasitter på huden, og en infektion kan medføre overdreven slimproduktion, så der dannes et gråhvidt lag på hudens overflade. Dette ses tydeligt på øjnene eller ved at betragte fisken fra en vinkel. Når tilstanden forværres, opstår der røde pletter, gællerne hæver, og vejrtrækningen bliver hurtigere. Alvorligt angrebne fisk bliver ofte sløve: De ligger på bunden af akvariet eller gnider sig mod sten eller planter.

Cerpofor Alparex indeholder stoffer, der virker mod de ovennævnte infektioner. Det virker desuden desinficerende mod sekundære bakterieinfektioner. Ved en alvorlig bakterieinfektion er det bedre at behandle fiskene med Cerpofor Bactyfec. Hvis kløen fortsætter efter behandling med Alparex, anbefales det at behandle fiskene igen efter 14 dage med Cerpofor Dactycid, et specifikt produkt mod hud- og gælleikter.