

Cerpofor Alparex

Manuale d’uso

IT

Efficace contro parassiti invisibili, funghi e malattia dei puntini bianchi.

Calcolo del volume dell’acquario

calcolare il volume dell’acquario nel modo più preciso possibile: lunghezza x larghezza x altezza, misurate in decimetri, danno il volume della vasca in litri. Sottrarre quindi il volume di eventuali substrati, piante, pietre, legni fossilizzati, decorazioni ecc. Questi elementi rappresentano normalmente circa il 10%, ma possono arrivare fino al 30% negli acquari ben arredati.

Cerpofor Alparex è disponibile nei seguenti formati: 100 ml per 500 ltr di acqua dell’acquario e 1.000 ml per 5.000 ltr.

Qualità dell’acqua

Per un trattamento efficace e una rapida guarigione dei pesci malati, è essenziale mantenere una buona qualità dell’acqua. Pertanto, controllare sempre la qualità dell’acqua prima e dopo il trattamento e correggerla se necessario.

Dosaggio

1 ml ogni 5 litri di acqua dell’acquario. Misurare la quantità necessaria con il misurino in dotazione, scioglierla in 1 litro di acqua dell’acquario e distribuirla sulla superficie dell’acqua. Accendere un aeratore. In alcuni casi può essere necessario ripetere il trattamento. Se necessario, si può somministrare una dose dimezzata il 3° e il 5° giorno.

Durante il trattamento rimuovere il carbone e la zeolite; spegnere le lampade UV e l’ozono fino a una settimana dopo l’ultima somministrazione. Durante il trattamento non effettuare cambi d’acqua, a meno che la scarsa qualità dell’acqua non lo renda necessario; in tal caso, dosare nuovamente 1 ml ogni 5 ltr di acqua di rubinetto aggiunta.

Il filtro dell’acquario può rimanere acceso durante il trattamento. Il trattamento con Cerpofor Alparex colora l’acqua. Per rimuovere il colore dall’acqua, è possibile riprendere i cambi d’acqua settimanali (consigliamo il 10-20%) una settimana dopo l’ultima aggiunta di Alparex e filtrare con carbone attivo.

Avvertenza

Per quanto noto, questo prodotto è innocuo per gli invertebrati, come rane, gamberetti, gamberi d'acqua dolce e lumache. Purtroppo non possiamo garantirlo; l'uso di Cerpofor Alparex in presenza di questi animali è quindi a vostro rischio. In caso di esperienze positive o negative, vi preghiamo di comunicarcele tramite www.colombo.nl o via e-mail all'indirizzo info@colombo.nl

Cerpofor Alparex è stato sviluppato per l'uso nei normali acquari di comunità con un pH compreso tra 7 e 8.5 e una KH di 4-8°DH. Gli acquari specializzati presentano spesso valori dell'acqua anomali, che possono causare una risposta anomala, spesso negativa, ad Alparex; ciò riguarda soprattutto le vasche con pH e/o KH bassi, nonché gli acquari in cui si utilizza acqua a osmosi inversa con conducibilità molto bassa. I pesci selvatici possono essere molto sensibili ai medicinali e spesso reagiscono peggio ai farmaci rispetto ai pesci allevati in cattività. L'uso di Alparex in queste situazioni è strettamente a vostro rischio!

Solo per l'uso su pesci ornamentali d'acqua dolce negli acquari. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare nella confezione a una temperatura compresa tra 4 e 32°C. Non inalare. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrargli la confezione o l'etichetta. Questo prodotto causa macchie permanenti su indumenti, materiali per pavimentazioni ecc.

Combinazioni

La somministrazione combinata di più di 2 prodotti e/o medicinali è a proprio rischio. Non utilizzare contemporaneamente prodotti di altra provenienza!

Informazioni

La malattia dei puntini bianchi è causata da Ichthyophthirius multifiliis. Questa malattia si manifesta generalmente quando le difese naturali dei pesci sono ridotte o compromesse. Tra le situazioni che possono provocarla vi sono il trasporto, il sovraffollamento o l'introduzione di nuovi pesci. I pesci colpiti presentano sulla pelle macchie bianche di dimensioni comprese tra 0,1 e 1 mm. Le macchie possono essere isolate o raggruppate. I pesci si sfregano contro piante o rocce e talvolta oscillano avanti e indietro nell'acqua. In seguito a una perdita significativa della superficie cutanea (respiratoria) o quando vengono colpite le branchie, insorge affanno e, infine, il pesce muore.

Le infezioni fungine (causate per la maggior parte da Saprolegnia) sono caratterizzate dalla comparsa di escrescenze bianco-grigiastre, simili a batuffoli di cotone, sulla pelle e/o sulle branchie. Il fungo cresce sulla superficie cutanea, ma può anche penetrare e colpire i muscoli e gli organi interni. Questi casi spesso si rivelano fatali.

Il prurito può essere causato da diversi parassiti, tra cui Trichodina, Ichthyobodo e Chilodonella, oltre a Gyrodactylus (vermi della pelle) e Dactylogyrus (vermi delle branchie). Si tratta di vermi piatti dotati di ventose, di circa 0,3-0,5 mm. La pelle dei pesci costituisce la principale barriera contro gli agenti patogeni e l'infezione da parte di un parassita può aprire la strada ad altri.

Sulla pelle sono spesso presenti diversi tipi di parassiti e un'infezione può causare un'eccessiva produzione di muco, che forma uno strato bianco-grigiastro sulla superficie cutanea. È facile rilevarlo sugli occhi o osservando il pesce da un'angolazione. Quando la condizione peggiora, compaiono macchie rosse, le branchie si gonfiano e la respirazione accelera. I pesci gravemente colpiti tendono a essere apatici: restano sul fondo dell'acquario o si sfregano contro rocce o piante.

Cerpofor Alparex contiene sostanze che agiscono contro le infezioni sopra indicate. Inoltre, è un disinfettante contro le infezioni batteriche secondarie. In caso di grave infezione batterica, è preferibile trattare i pesci con Cerpofor Bactyfec. Se il prurito persiste dopo il trattamento con Alparex, si consiglia di trattare nuovamente i pesci dopo 14 giorni con Cerpofor Dactycid, un prodotto specifico contro i vermi della pelle e delle branchie.