


Cerpofor Bactyfec

Bedienungsanleitung

DE

Gegen externe bakterielle Infektionen wie Hautgeschwüre, Flossenfäule und Lochkrankheit.

Inhaltsberechnung

Berechnen Sie den Aquarium Inhalt so genau wie möglich: Länge x Breite x Höhe in Dezimeter ergibt den Inhalt eines leeren Aquariums in Liter. Für Pflanzen, Bodengrund, Dekorationsmittel und dergleichen werden im Normalfall 10% abgerechnet. Jedoch sind in “vollgepackten” Becken manchmal 30% angebracht.

Cerpofor Bactyfec ist erhältlich in einer 100 ml Verpackung für 500 Ltr Aquariumwasser und 1.000 ml für 5.000 Ltr.

Wasserqualität

Die wesentliche Voraussetzung für eine optimale Wirkung von Cerpofor Bactyfec und eine schnelle Genesung der kranken Fische ist eine gute Wasserqualität. Testen Sie deshalb die Wasserqualität vor und nach der Behandlung und verbessern diese, wenn nötig.

Dosierung

Vor Gebrauch schütteln. Bactyfec muss an 3 aufeinander folgenden Tagen verwendet werden. Tag 1: 1 ml pro 15 Liter Aquarium Wasser, Tag 2: 1 ml auf 15 Liter Aquarium Wasser und am 3. Tag: 1 ml auf 15 Liter Aquarium Wasser. Die benötigte Menge im mitgelieferten Messbecher genau dosieren und über die Wasseroberfläche des Aquariums verteilen.

Die aktiven Stoffe in Bactyfec sind natürliche Stoffe und also kann der Sauerstoffgehalt in Ihrem Aquarium durch den natürlichen Abbau dieser Stoffe sinken. Achten Sie darum auf eine optimale Belüftung in Ihrem Aquarium, sodass Ihre Fische immer ausreichend Sauerstoff bekommen.

Nicht über Kohle oder Zeolit filtern; UVC-Gerät und Ozonanlage bis 1 Woche nach der letzten Verabreichung ausschalten. Während der Behandlung kein Wasser wechseln, nur dann wechseln wenn die Wasserqualität Sie dazu zwingt; in diesem Fall 1 ml pro 15 ltr gewechseltes Leitungswasser nachdosieren.

Der Aquariumfilter muss während der Behandlung eingeschaltet bleiben. Eine Woche nach der letzten Behandlung können Sie wieder anfangen mit der wöchentliche Wasserwechsel; wir empfehlen 10 bis 20%.

Warnung

Soweit bekannt ist dieses Mittel unschädlich für Wirbellose wie Frösche, Garnelen, Süßwasserkrebse und Schnecken. Leider können wir es nicht garantieren, so dass die Verwendung von Cerpofor Bactyfec in Gegenwart von solchen Tieren auf eigenes Risiko ist. Falls Sie uns Ihre Erfahrungen, entweder positiv oder negativ, mitteilen möchten, dann benachrichtigen Sie uns bitte über **www.colombo.nl** oder über E-mail: **info@colombo.nl.**

Cerpofor Bactyfec ist für die Anwendung in normalen Gesellschafts-Aquarien entwickelt worden mit ein pH Wert zwischen 7 und 8.5 und ein KH Wert von 4-8°DH. Spezialisierte Aquarien haben oft abweichende Wasserwerte wodurch die Reaktion auf Bactyfec abweichend sein kann von den normalen Wert; hiermit meinen wir, Aquarien mit einem niedrigen pH oder KH Wert oder Aquarien die mit Osmosewasser betrieben werden, wodurch der Leitwert sehr niedrig ist. Wildfänge können sehr empfindlich sein für Medikamente und reagieren oft schlechter auf Medikamente als gezüchtete Fische. Für die abweichende Situation übernehmen wir keine Haftung und ist auf eigenes Risiko.

Heilmittel für Aquarienfische in Süßwasser. Nur für Tiere. Nicht bei Tieren anwenden die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. In der Originalverpackung bei einer Temperatur zwischen 4 und 32°C aufbewahren. Nicht einatmen. Den Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Im Fall einer versehentlichen Einnahme, sofort einen Arzt aufsuchen und die Verpackung oder das Etikett vorlegen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Eine Verabreichung von mehr als 2 Präparate und/oder Medikamenten in einer Kombination geht auf Ihr eigenes Risiko. Colombo Präparate sollen nicht gleichzeitig mit fremden Produkten eingesetzt werden.

Information

Lochkrankheit, Hautgeschwüre, Maulfäule und Flossenfäule werden durch Bakterien verursacht, vor allem durch Cytophaga columnaris (früher Flexibacter genannt). Wird die Haut durch Scheuern, Fischläuse oder eine Krankheit wie die Weißpünktchenkrankheit verletzt, können bakterielle Infektionen leichter auftreten.

Die Infektion breitet sich in der Regel kreisförmig vom geschädigten Hautbereich nach außen aus; es entstehen runde Läsionen oder Geschwüre. Das Hautgewebe stirbt ab, und auf der Haut der Fische scheinen weiße Flecken zu erscheinen. Dies wird häufig mit einem Pilzbefall verwechselt. Fällt dieses weiße Gewebe ab, bleibt ein rotes Loch oder Hautgeschwür zurück.

Maulfäule tritt rund um das Maul in Form kompakter weißer Flecken auf. Die Flossen können von Flossenfäule befallen werden und ausgefranst aussehen. Die Fische werden teilnahmslos. Sind auch die Kiemen oder inneren Organe betroffen, führt dies schnell zum Tod.

Da Cerpofor Bactyfec nur gegen äußere bakterielle Infektionen wirksam ist, werden innere bakterielle Infektionen nicht oder zumindest kaum beeinflusst. Sollte dies der Fall sein, wird dringend empfohlen, einen Tierarzt aufzusuchen, der vorzugsweise auf Fischkrankheiten spezialisiert ist.