


Cerpofor Bactyfec

Manuale d’uso

IT

Efficace contro le infezioni batteriche esterne, come ulcere cutanee, marciume delle pinne e malattia dei buchi.

Calcolo del volume dell’acquario

Calcolare il volume dell’acquario nel modo più preciso possibile: lunghezza x larghezza x altezza, misurate in decimetri, forniscono il volume della vasca in litri. Occorre poi sottrarre il volume di eventuali substrati, piante, pietre, legni fossili, decorazioni ecc. In genere questi elementi rappresentano circa il 10% del volume, ma possono arrivare fino al 30% negli acquari ben allestiti.

Cerpofor Bactyfec è disponibile nei seguenti formati: 100 ml per 500 l di acqua dell’acquario e 1.000 ml per 5.000 l.

Qualità dell’acqua

Per un trattamento efficace e una rapida guarigione dei pesci malati, è essenziale che l’acqua sia di buona qualità. Pertanto, controllare sempre la qualità dell’acqua prima e dopo il trattamento e, se necessario, correggerla.

Dosaggio

Agitare prima dell'uso. Bactyfec va aggiunto per 3 giorni consecutivi. Giorno 1: 1 ml ogni 15 litri di acqua dell'acquario; giorno 2: 1 ml ogni 15 litri di acqua dell'acquario; giorno 3: 1 ml ogni 15 litri di acqua dell'acquario. Misurare la quantità necessaria con il misurino e distribuirla sulla superficie dell'acqua.

I principi attivi di Bactyfec sono sostanze naturali e la loro degradazione biologica può quindi ridurre il livello di ossigeno nell'acquario. Assicurarsi pertanto che l'aerazione dell'acqua dell'acquario sia ottimale, così che i pesci abbiano sempre a disposizione ossigeno sufficiente.

Rimuovere il carbone e la zeolite durante il trattamento; spegnere le lampade UV e l'ozono fino a una settimana dopo l'ultima somministrazione. Durante il trattamento non effettuare cambi d'acqua, a meno che la scarsa qualità dell'acqua non lo renda necessario; in tal caso, aggiungere nuovamente il prodotto nella dose di 1 ml ogni 15 l di acqua di rubinetto aggiunta.

Il filtro dell'acquario può rimanere acceso durante il trattamento. Una settimana dopo l'ultima aggiunta di Bactyfec è possibile riprendere i cambi d'acqua settimanali (si consiglia il 10-20%).

Avvertenza

Per quanto noto, questo prodotto è innocuo per gli invertebrati, come rane, gamberetti, gamberi d'acqua dolce e lumache. Purtroppo non possiamo garantirlo, pertanto l'uso di Cerpofor Bactyfec in presenza di tali animali è a proprio rischio. In caso di esperienze positive o negative, vi preghiamo di informarci tramite **www.colombo.nl** o via e-mail: **info@colombo.nl.**

Cerpofor Bactyfec è stato sviluppato per l'uso nei comuni acquari di comunità con un pH compreso tra 7 e 8,5 e un KH di 4-8°DH. Gli acquari specializzati presentano spesso valori dell'acqua anomali, che possono provocare una risposta anomala, spesso negativa, a Bactyfec; questo vale soprattutto per le vasche con pH e/o KH bassi e per gli acquari che utilizzano acqua da osmosi inversa, in cui la conducibilità è molto bassa. I pesci selvatici possono essere molto sensibili ai medicinali e spesso reagiscono peggio ai trattamenti rispetto ai pesci allevati in cattività. L'uso di Bactyfec in queste situazioni è esclusivamente a proprio rischio!

Solo per l'uso su pesci ornamentali d'acqua dolce negli acquari. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare nella confezione a una temperatura compresa tra 4 e 32 °C. Non inalare. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrare la confezione o l'etichetta.

Combinazioni

La somministrazione combinata di più di 2 prodotti e/o medicinali è a proprio rischio. Non utilizzare contemporaneamente con prodotti di altra provenienza!

Informazioni

La malattia dei buchi, le ulcerazioni cutanee, la micosi della bocca e la corrosione delle pinne sono causate da batteri, principalmente da Cytophaga columnaris (precedentemente chiamato Flexibacter). Quando la pelle viene danneggiata da abrasioni, pidocchi dei pesci o malattie come la malattia dei puntini bianchi, si apre la strada alle infezioni batteriche.

L'infezione generalmente si diffonde in modo circolare a partire dalla zona cutanea danneggiata e compaiono lesioni rotonde o ulcere. La pelle muore e i pesci sembrano avere macchie bianche sulla pelle. Spesso questo fenomeno viene confuso con una micosi. Quando questo tessuto bianco si stacca, lascia una ferita rossa o un'ulcera cutanea.

La micosi della bocca si manifesta intorno alla bocca sotto forma di macchie bianche compatte. Le pinne possono essere colpite dalla corrosione e assumere un aspetto sfrangiato. I pesci diventano apatici e, se vengono colpiti anche le branchie o gli organi interni, la morte sopraggiunge rapidamente.

Poiché Cerpofor Bactyfec è efficace solo contro le infezioni batteriche esterne, le infezioni batteriche interne non vengono contrastate o lo sono solo in minima parte. Se questo fosse il caso, si raccomanda vivamente di consultare un veterinario, preferibilmente specializzato in malattie dei pesci.