

Cerpofor Dactycid

Brugervejledning

DK

Effektiv mod udvendige bakterieinfektioner som hudsår, finneråd og hulsyge.

Beregning af akvariets volumen

Beregn akvariets volumen så præcist som muligt: længde x bredde x højde målt i decimeter giver akvariets volumen i liter. Derefter skal volumenet af eventuelt bundlag, planter, sten, forstenet træ, pynt osv. trækkes fra. Dette udgør normalt omkring 10 %, men kan udgøre op til 30 % i velindrettede akvarier.

Cerpofor Dactycid fås i følgende størrelser: 100 ml til 500 l akvarievand og 1.000 ml til 5.000 l.

Vandkvalitet

God vandkvalitet er afgørende for en effektiv behandling og for, at de syge fisk hurtigt kommer sig. Test derfor altid vandkvaliteten før og efter behandlingen, og korrigér den om nødvendigt.

Dosering

Ryst i 30 sekunder før brug! 1 ml pr. 5 liter akvarievand. Mål den nødvendige mængde af med det medfølgende målebæger, og fordel den over vandoverfladen. Tænd en belufter. Skift 25 % af vandet før behandlingen og yderligere 25 % efter 48 timer. Det anbefales at gentage behandlingen efter 14 dage.

Fjern aktivt kul og zeolit under behandlingen. UV-lamper og ozon skal være slukket indtil 48 timer efter den sidste dosering. Undlad vandskift under behandlingen, medmindre dårlig vandkvalitet gør det nødvendigt. I så fald skal der doseres igen med 1 ml pr. 5 l tilført postevand.

Akvariefilteret kan være tændt under behandlingen. En uge efter den sidste tilsætning af Dactycid kan du genoptage de ugentlige vandskift (vi anbefaler 10-20 %).

Advarsel

Dette produkt kan være skadeligt for hvirvelløse dyr såsom frøer, rejer, ferskvandskrebs og snegle samt for elefantfisk og beslægtede arter. Det anbefales derfor ikke at bruge Cerpofor Dactycid, hvis sådanne dyr er til stede. Hvis du har positive eller negative erfaringer, bedes du give os besked via **www.colombo.nl** eller e-mail: **info@colombo.nl**

Cerpofor Dactycid er udviklet til brug i almindelige selskabsakvarier med en pH-værdi mellem 7 og 8,5 og en KH på 4-8°DH. Specialakvarier har ofte unormale vandværdier, hvilket kan føre til en unormal, ofte negativ reaktion på Dactycid. Det gælder især akvarier med lav pH og/eller KH samt akvarier, hvor der bruges vand fra omvendt osmose, og hvor ledningsevnen er meget lav. Vildtfangede fisk kan være meget følsomme over for lægemidler og reagerer ofte dårligere på medicin end fisk, der er opdrættet i fangenskab. Brug af Dactycid i disse situationer sker helt på eget ansvar!

Må kun anvendes til prydfisk i ferskvandsakvarier. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares i æsken ved en temperatur på 4 til 32 °C. Må ikke indåndes. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved indtagelse skal du straks søge læge og vise emballagen eller etiketten.

Kombinationer

Brug af mere end 2 produkter og/eller lægemidler i kombination sker på eget ansvar. Må ikke anvendes samtidig med produkter af anden oprindelse!

Information

Hageorme (Acanthocephala) har kroge, som de bruger til at fæstne sig til tarmvæggen. Æggene udskilles med afføringen. Rundorme (Nematodes) er store, runde orme, der forekommer i fordøjelseskanalen. Deres larver overføres også for eksempel via snudebiller i foderet. Nogle larver vandrer rundt i fiskens krop og indkapsles i muskler og organer. Under visse omstændigheder kan disse hvilende larver udvikle sig til voksne orme. Fisk, der er angrebet af disse to typer orme, bliver magre og har slimet afføring. Cammalanus cotti er en levendefødende rundorm, der viser sig som en streng af rødlige orme, der hænger ud af fiskens gat. De synlige orme er kun et symptom på de mange orme, der findes i tarmen. Hudorm og gælleorm er fladorme (monogenetiske ikter). Gyrodactylus er en hudorm, som også kan angribe gællerne, mens Dactylogyrus er en gælleorm, som også kan forekomme på huden. Larverne fra disse orme kan svømme på egen hånd og angribe andre fisk. Hudorme formerer sig meget hurtigt, fordi de føder levende unger. Angrebet giver huden et gråligt, slimet udseende. Gælleorme lægger æg, og de nyklækkede larver kan angribe gællerne sammen med de voksne orme. Fiskene svømmer med gællerne permanent åbne. De angrebne fisk lider af iltmangel og gnider sig mod sand og sten. Sekundære svampeinfektioner komplicerer ofte sygdommen, ligesom hvid plet-syge og bakterieinfektioner gør. Disse problemer kan bekæmpes med Cerpofor Alparex og Cerpofor Bactyfec. Hydraer er ferskvandspolypdyr, som kan komme ind i akvariet via dafnier. De formerer sig eksplosivt på planter og ruder og kan blive et problem. De kan også sætte sig fast på yngel. Planarier er små, hvidgrå fladorme, som normalt findes i stort antal på de forreste ruder, især hvis der ikke er lys. De lever hovedsageligt af dødt organisk materiale, men hvis der er mangel på dette, kan de snylte på gællerne og huden samt på sneglenes kappe.