

Cerpofor Dactycid

Manuel d’utilisation

FR

Contre les vers internes et externes, tels les nématodes, les vers de la peau (Gyrodactylus) et des branchies (Dactylogyrus).

Evaluation du volume

Calculer le volume en litres de votre aquarium le plus précisément possible: longueur x largeur x profondeur moyenne en centimètres, puis divisez par 1000. Puis, il est conseillé de déduire approximativement le volume occupé par les plantes, pierres, bois fossile, sable, etc. En général il s'agit de 10%, dans les bacs très garnis, cela peut atteindre 30% du volume total.

Qualité de l'eau

N'oubliez pas que la qualité de l'eau est essentielle tant au niveau de l'efficacité optimale des médicaments que pour la guérison rapide des poissons malades. C'est pourquoi il est important de toujours tester votre eau avant et après le traitement et d'en corriger les valeurs si nécessaire.

Dosage recommandé

Pour traiter 25 litres d'eau de l'aquarium : remplir le tube fourni avec 10 ml d'eau. Ajoutez 6 gouttes de liquide "component A". Ouvrez une capsule et ajoutez la poudre. Fermez et agiter vigoureusement le mélange puis versez le dans l'aquarium. Répétez cette opération afin de traiter le volume complet de l'aquarium. Renouveler le traitement après 10 jours si nécessaire ou obligatoire. Ne pas filtrer au charbon ou zéolite; les lampes UV et l'équipement doivent être débranchés jusqu'à 48 heures après l'administration du traitement. Pendant le traitement, il est déconseillé de faire des changements d'eau. Si de mauvaises conditions d'eau l'exigent, vous devez rajouter une dose de traitement au prorata du renouvellement d'eau. Vous pouvez laisser le filtre en marche pendant le traitement.

Une semaine après le dernier traitement, vous devez effectuer des changements d'eau hebdomadaires (10-20%).

Avertissement

Ce produit peut être nuisible pour les grenouilles, les crevettes, les écrevisses, les escargots ainsi que pour les poissons sensibles comme les poissons-éléphants. L'utilisation de Cerpofor Dactycid n'est donc pas recommandée en cas de présence de ces espèces. Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer vos expériences positives ou négatives, sur **www.colombo.nl** ou e-mail: **info@colombo.nl.**

Cerpofor Dactycid Pro est développé pour une utilisation dans un aquarium communautaire standard avec un pH entre 7 et 8,5 et un KH de 4-8°DH. Les aquariums spéciaux ont souvent des valeurs différentes qui peuvent affecter les performances de Dactycid Pro : par exemple les aquariums avec un pH et/ou KH bas, ou l'utilisation d'un osmoseur (conductivité basse).

Les espèces sauvages sont aussi plus sensibles et peuvent répondre négativement aux médicaments, contrairement aux espèces d'élevage. L'utilisation de Dactycid Pro dans ces cas est sous votre responsabilité.

Convient aux poissons d'eau douce d'aquarium uniquement. Maintenir hors de portée des enfants. Conserver le produit dans sa boîte entre 4 et 32°C. Ne pas inhaler. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement, muni de l'emballage ou de l'étiquette.

Combinaisons

Dactycid Pro ne doit pas être utilisé avec un autre produits ou médicament. Attendez au minimum une semaine avant d'utiliser un autre produit.

Information

Les Acanthocéphales ont un museau muni de crochets qui leur permettent de s'accrocher aux parois intestinales. Les œufs des vers sont éliminés avec les excréments du poisson. Les Nématodes sont des vers longs et ronds, qui se trouvent dans les intestins. Leurs larves se propagent également par la nourriture vivante. Il y a des larves qui parcourent tout le corps du poisson, et peuvent se trouver enkystées dans le tissu des muscles et des organes. Dans certaines situations de nouveaux vers naissent de ces larves non actives. Les poissons infectés par les Nématodes et les Acanthocéphales maigrissent et produisent des excréments visqueux. Cammalanus cotti est un ver rond vivipare, qui se présente sous la forme d'une grappe de petits vers rouges, qui pend à l'anus du poisson. Les vers que nous voyons là ne sont que le symptôme de la présence de multiples vers dans l'intestin. Les Trématodes Monogena sont des vers plats. Le Gyrodactylus est un ver cutané, qui parfois se trouve aussi sur les branchies, et le Dactylogyrus est un ver branchial, qui parfois se trouve aussi sur la peau. Leurs larves sont capables de nager vers d'autres poissons et de les contaminer.

Les Gyrodactyles sont vivipares. Pour cette raison, leur nombre augmente très rapidement et donne à la peau du poisson un aspect gris et visqueux. Les Dactylogyrus pondent. Les larves

et les vers adultes attaquent les branchies, ce qui amènent les poissons atteints à nager les opercules ouverts. Dans le cas de ces deux infections, les poissons étouffent. Ils se frottent dans le sable et contre les pierres. L'infection est aggravée par les champignons, la maladie des points blancs, et les microbes, qui heureusement peuvent être combattus d'une manière efficace par Cerpofor® Alparex et Cerpofor® Bactyfec. Les Hydres sont des polypes d'eau douce, qui arrivent dans l'aquarium en même temps que les daphnies. Elles se reproduisent très rapidement sur les plantes et les parois de l'aquarium et sont particulièrement importunes. Les Planaires sont des petits vers plats blanc-gris, que l'on trouve en masse sur la paroi avant de l'aquarium surtout quand la lumière est éteinte. En principe, ils se nourrissent de particules organiques. Mais faute de cela, ils vivent en parasite sur les branchies et la muqueuse du poisson, ainsi que dans les cavités palléales des escargots.