

Cerpofor Femsee

Manuale d’uso

IT

Efficace contro le micosi e la malattia dei punti bianchi.

Calcolo del volume dell’acquario

Calcolare il volume dell’acquario nel modo più preciso possibile: lunghezza x larghezza x altezza, misurate in decimetri, danno il volume della vasca in litri. Occorre poi sottrarre il volume di eventuale substrato, piante, pietre, legni fossilizzati, decorazioni ecc. In genere questi elementi rappresentano circa il 10% del volume, ma possono arrivare fino al 30% negli acquari ben allestiti.

Cerpofor Femsee è disponibile nei seguenti formati: 100 ml per 500 l di acqua dell’acquario e 1.000 ml per 5.000 l.

Qualità dell’acqua

Per un trattamento efficace e una rapida guarigione dei pesci malati, è essenziale che l’acqua sia di buona qualità. Pertanto, controllare sempre la qualità dell’acqua prima e dopo il trattamento e, se necessario, correggerla.

Dosaggio

1 ml ogni 5 litri di acqua dell’acquario. Misurare la quantità necessaria con il misurino in dotazione, scioglierla in 1 litro di acqua dell’acquario e distribuirla sulla superficie dell’acqua. Accendere un aeratore. In alcuni casi può essere necessario ripetere il trattamento. Se necessario, somministrare una dose dimezzata il 2° e il 3° giorno.

Durante il trattamento rimuovere il carbone e la zeolite; spegnere le lampade UV e l’ozonizzatore fino a 48 ore dopo l’ultima somministrazione. Durante il trattamento non effettuare cambi d’acqua, a meno che la scarsa qualità dell’acqua non lo renda necessario; in tal caso, aggiungere una dose di 1 ml ogni 5 l di acqua di rubinetto introdotta.

Il filtro dell’acquario può rimanere acceso durante il trattamento. Il trattamento con Cerpofor Femsee scolorisce l’acqua. Per eliminare il colore dall’acqua, una settimana dopo l’ultima somministrazione di Femsee è possibile riprendere i cambi d’acqua settimanali (consigliamo il 10-20%) e filtrare con carbone attivo.

Avvertenza

Per quanto noto, questo prodotto è innocuo per gli invertebrati, come rane, gamberetti, gamberi d'acqua dolce e lumache. Purtroppo non possiamo garantirlo, pertanto l'uso di Cerpofor Femsee in presenza di questi animali è a proprio rischio. In caso di esperienze positive o negative, vi preghiamo di comunicarcele tramite **www.colombo.nl** o **e-mail:** info@colombo.nl.

Cerpofor Femsee è stato sviluppato per l'uso nei normali acquari di comunità con un pH compreso tra 7 e 8,5 e un KH di 4-8°DH. Gli acquari specializzati presentano spesso valori dell'acqua anomali, che possono causare una risposta anomala, spesso negativa, a Femsee; ciò riguarda soprattutto le vasche con pH e/o KH bassi e gli acquari che utilizzano acqua da osmosi inversa, con una conducibilità molto bassa. I pesci selvatici possono essere molto sensibili ai medicinali e spesso reagiscono negativamente ai trattamenti rispetto ai pesci allevati in cattività. L'uso di Femsee in queste situazioni è interamente a proprio rischio!

Da usare esclusivamente su pesci ornamentali d'acqua dolce negli acquari. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare nella confezione a una temperatura compresa tra 4 e 32°C. Non inalare. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrargli la confezione o l'etichetta. Questo prodotto causa macchie permanenti su indumenti, materiali per pavimentazioni ecc.

Combinazioni

La somministrazione combinata di più di 2 prodotti e/o medicinali è a proprio rischio. Non utilizzare contemporaneamente con prodotti di altra provenienza!

Informazioni

Le micosi (causate perlopiù da Saprolegnia) si riconoscono dalla comparsa di escrescenze bianco-grigiastre, simili a batuffoli di cotone, sulla pelle e/o sulle branchie. Il fungo cresce sulla superficie della pelle, ma può anche penetrare e colpire i muscoli e gli organi interni. Questi casi si rivelano spesso fatali.

La malattia dei punti bianchi è causata da Ichthyophthirius multifiliis. Questa patologia insorge solitamente quando le difese naturali dei pesci sono ridotte o compromesse. Tra le circostanze che possono favorirla vi sono il trasporto, il sovraffollamento o l'introduzione di nuovi pesci. I pesci colpiti presentano sulla pelle punti bianchi di dimensioni comprese tra 0,1 e 1mm. I punti possono essere isolati o raggruppati. I pesci sfregano la pelle contro le piante o le rocce e talvolta possono oscillare avanti e indietro nell'acqua. In seguito a una notevole perdita di superficie cutanea (respiratoria) o quando sono colpite le branchie, insorge l'affanno e, infine, il pesce muore.